



CLEAN & SEAL™

Frühe und wirksame Behandlung von periimplantären Infektionen

Das CLEAN & SEAL™ Konzept wurde auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen als Unterstützung für die Behandlung und Kontrolle von periimplantärer Mukositis entwickelt.<sup>8,9</sup>

CLEAN & SEAL™ basiert auf einer gründlichen Entfernung des Biofilms durch mechanische Reinigung in Kombination mit der adjuvanten Anwendung eines Reinigungsgels (PERISOLV®) und anschließender Versiegelung des Defekts mit vernetzter Hyaluronsäure (hyaDENT BG), um eine erneute Infektion zu verhindern und Heilungsprozesse zu unterstützen.<sup>13</sup>

Dadurch kann die Entwicklung einer Periimplantitis verhindert werden, sodass keine aufwändigen Verfahren zur Wiederherstellung des periimplantären Gewebes nötig sind und der Implantaterhalt gesichert wird.

Thema

Frühe, wirksame Behandlung von periimplantärer Mukositis mit CLEAN & SEAL™



Die steigende Anzahl an Implantaten führt zu einer signifikanten Zunahme an Spätkomplikationen<sup>1-3</sup> im Sinne von periimplantären Infektionen<sup>4-7</sup>:

Periimplantäre Mukositis,<sup>8-10</sup> charakterisiert durch eine Entzündung des Weichgewebes, und Periimplantitis, ausgezeichnet durch einen fortschreitenden Verlust des unterstützenden Knochens.<sup>11</sup>

Da Periimplantitis im schlimmsten Fall zum Implantatverlust führen kann, sollten periimplantäre Infektionen in einem frühen Stadium behandelt werden.

Aufgrund der limitierten regenerativen Potenz des erkrankten Gewebes und der Komplexität der Implantat-Oberfläche besteht immer das Risiko eines Rezidivs bzw. einer erneuten Infektion.<sup>12</sup>

CLEAN & SEAL™ bietet ein Therapiekonzept für die Behandlung von periimplantärer Mukositis.

Verfügbare Produkte

Artikel	Artikelnummer	Darreichung
PERISOLV®	0131.401	1 Box à 5 Portionen
hyaDENT BG	0162.512v2	2 Zylinderampullen (2 x 1,2 ml)

Literatur

1. Abrahamsson I et al. J Clin Periodontol 1999;26:600-607.
2. Baelum V et al. J Periodontol 2004;75:1404-1412.
3. Kowolik J. ZM 2008;98(12):1728-1732.
4. Pecanov-Schröder A. Dental Magazin 2008;3:58-63.
5. Roos-Jansaker AM et al. J Clin Periodontol 2006;33:290-295.
6. Schwarz F et al. Quintessenz Verlag Berlin (2007).
7. Zitzmann NU. ZMK 2009;25(9):576-582.
8. Jepsen S et al. J Clin Periodontol 2015;42(Suppl. 16):S152-S157.
9. Costa FO et al. Journal of Clinical Periodontology 2012;39:173-183.
10. Heitz-Mayfield LJ et al. J Periodontol. 2018 Jun;89 Suppl 1:S257-S266.
11. Berglundh T et al. J Periodontol. 2018;89(Suppl 1):S313-S318.
12. Renvert S et al. J Clin Periodontol. 2006 May;33(5):362-369.
13. Pirnazar P et al. J Periodontol 1999;70:370-374.
14. Jurczyk K et al. Clin Oral Investig. 2016 Nov;20(8):2165-2173. Epub 2016 Jan 12
15. Rajan P et al. Universal Research Journal of Dentistry. 2013;3:113.
16. King SR et al. Surgery 1991;109(1):76-84.
17. Yildirim S et al. J Periodontol. 2017;15:1-14.
18. Pilloni A et al. Clin Oral Investig. 2018. doi: 10.1007/s00784-018-2537-4. Erratum in: Clin Oral Investig. 2018;22(8):2961-2962.
19. Mueller A et al. Clin Oral Investig. 2017;21(4):1013-1019.
20. Asparuhova M et al. J Periodontol Res 2019;54:33-45.
21. Asparuhova M et al. Clin Oral Investig. 2020;24(11):3923-3937.
22. Saranraj P and Naidu MA. IJPBA, 2013;4(5):853-859.

PERISOLV® ist eine eingetragene Marke und wird hergestellt von REGEDENT AG, Zollikerstr. 144, 8008 Zürich, Schweiz.

HYADENT BG ist eine eingetragene Marke und wird hergestellt von BioScience GmbH, Walsmühler Str. 18, 19072 Dümmer, Deutschland. 8161.904DE-D V210415.

KONTAKT

REGEDENT GmbH  
Pfarrgasse 6  
D - 97337 Dettelbach  
Tel +49 (0) 93 24 - 6 04 99 27  
Fax +49 (0) 93 24 - 6 04 99 26  
Mail kontakt@regedent.com  
www.regedent.de



PERISOLV®  
Weitere Informationen



HYADENT  
Weitere Informationen

1. CLEAN

Reinigung des Defekts und der Implantatoberfläche

Entscheidend für ein positives Behandlungsergebnis sind die Infektionskontrolle und ein extensives Debridement zur gründlichen Entfernung des Biofilms.<sup>8,9</sup>

VORTEILE

- Aufweichen der extrazellulären Matrix des Biofilms<sup>14</sup>
- Verstärkung der Bakterienentfernung durch mechanisches Debridement
- Erleichterte Entfernung des Biofilms

2. SEAL

Versiegelung des Defekts und Unterstützung der Wundheilung mit Hyaluronsäure

Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit durch die unterstützende Applikation schützender und regenerationsfördernder Versiegelungen, sowie durch regelmäßige Nachkontrollen zur Überwachung und Kontrolle der Entzündung.<sup>13</sup>

VORTEILE

- Stabilisierung und Schutz des Wundraums<sup>13, 15</sup>
- Beschleunigte kontrollierte Wundheilung<sup>15-17</sup>
- Unterstützung der Knochenregeneration<sup>16-21</sup>



# 1. CLEAN



## DIAGNOSE

Periimplantäre Mukositis ist gekennzeichnet durch erhöhte Sondierungstiefe und Sondierungsblutung (BoP+).



## INJEKTION

Applikation eines wirksamen Biofilmentferners (PERISOLV®).



## REINIGUNG

Sorgfältige mechanische Entfernung des Biofilms.



## WIEDERHOLUNG

2-3 x Wiederholung der Schritte 2 und 3 zur Verbesserung der Dekontamination.

# 2. SEAL



## VERSIEGELUNG

Nach Abschluss des periimplantären Debridements wird der Wundraum mit hyaDENT BG versiegelt.



## HEILUNG

Hyaluronsäure schützt die betroffene Stelle und fördert die Wund- und Gewebeheilung in mehreren Stufen.



## NACHKONTROLLE

Sorgfältige Pflege zu Hause und konstante Patientenmotivation bei jedem geplanten Follow-Up-Termin.

Mögliche Behandlung für ursachenbezogene nicht-chirurgische periimplantäre Maßnahmen

Zeitpunkt	Umfang (Dauer)
OP	Intensiv (ca. 1h)
1 Monat post-OP	Kontrolle (ca. 20 min)
4 Monate post-OP	Intensiv (ca. 1h)
Weitere Termine nach individueller Situation.	

## Behandlung von Periimplant-Mukositis mit CLEAN & SEAL™



**Prä-OP**  
Periimplantäre Mukositis mit 5 mm Sondierungstiefe und positivem Blutungsindex (BoP+).



Zum besseren Aufbrechen der extrazellulären Matrix des Biofilms wird PERISOLV® mehrfach aufgetragen.



**OP**  
Sorgfältige supragingivale Entfernung des Biofilms, insbesondere in den entzündeten Bereichen.



Nach 30s Wiederholung des mechanischen Debridements mit Handinstrumenten, Ultraschall und einer langsam rotierenden Titanbürste.



Applikation des wirksamen Biofilmentferners (PERISOLV®).



Nach Abschluss des nicht-chirurgischen periimplantären Debridements wird zur Förderung des Heilungsprozesses hyaDENT BG in die Tasche appliziert.<sup>19,21</sup>



Nach 30s mechanische Entfernung des Biofilms mit titanbeschichteter Edelstahlkürette und ortsspezifischen Instrumenten.



30 Tage post-OP Unterstützung der Heilung durch Hyaluronsäure: schützt nachweislich die Stelle und reguliert mehrere Wachstumsfaktoren hoch.<sup>20,22</sup>



Entfernung aller Biofilmrückstände an der von Mukositis betroffenen Stelle mit Ultraschall und einem speziellen Implantataufsatz.



1 Jahr post-OP Normale Sondierungswerte (BoP-). Auflösung der periimplantären Mukositis, unterstützt durch häusliche Pflege und Patientenmotivation.