EVIDENZ

# KLINISCHE EVIDENZ – FALL 3

Behandlung von Periimplant-Mukositis mit CLEAN & SEAL®

## Vor Behandlung

Periimplantäre Mukositis gekennzeichnet durch 5mm Sondierungstiefe mit positivem Blutungsindex (BoP+).

## Behandlung

Nach supragingivaler Entfernung des Biofilms wird PERISOLV® appliziert (li). Mechanische Entfernung des Biofilms (Edelstahlküretten & Ultraschallinstrumente, re). Die Auftragung von PERISOLV® und die mechanische Reinigung sollten 1-2 mal wiederholt werden.

Nach Abschluss des nicht-chirurgischen periimplantären Debridements wird zur Versiegelung der Tasche und zur Förderung des Heilungsprozesses vernetzte Hyaluronsäure (xHyA) in die Tasche appliziert.

## 30 Tage nach Behandlung

Der Heilungsprozess wird durch die Anwesenheit von Hyaluronsäure unterstützt.

## 1 Jahr nach Behandlung

Die Sondierungswerte liegen im Normbereich ohne Blutung. Die periimplantäre Mukositis wurde erfolgreich behoben.

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Marisa Roncati, Italien.